



Bangkok
International
Dental
Center

TM



BIDC
Bangkok International Dental Center




ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)
โทร. 02 692 4433 , 02 245 0055

Email: contact@bangkokdentalcenter.com
www.ThailandDentalClinic.com

เวลาทำการ :

วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 น. - 17.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ 09.00 น. - 18.00 น.

Follow me:



QR CODE



@bidcdental

คำแนะนำ
และข้อปฏิบัติ

ภายหลังศัลยกรรม
รากฟันเทียม | เสริมกระดูก
ผ่าตัดไซนัส



ศูนย์ทันตกรรม
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

โทร. 02 692 4433 , 02 245 0055



คำแนะนำและข้อปฏิบัติ ภายหลังศัลยกรรมรากฟันเทียม | เสริมกระดูก | ผ่าตัดไซนัส



- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และสัมผัสแอลกอฮอล์ของหรือ วัสดุต่างๆ ที่ไม่สะอาด เช่น นมวัว หรือ ฟ้าซิดหน้า เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารในบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด
- ภายในวันแรกหลังการผ่าตัด ควรรับประทานอาหารเหลวเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงเศษอาหาร ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่บาดแผล และห้ามรับประทานอาหาร หรือ เครื่องดื่มที่ร้อน หลังการผ่าตัด
- กัดผ้าก๊อชไว้แน่นๆ ประมาณ 15 นาที เพื่อหยุดเลือด หากเลือดไหลไม่หยุด หรือ มีอาการผิวด ปกติ ให้ติดต่อศูนย์ทันตกรรม หรือโรงพยาบาลทันที
- อาการบวมที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัด อาจเกิดขึ้นได้เป็นปกติ แต่หากมีอาการบวมมาก, ปวดมาก หรือ เลือดไหลไม่หยุด ให้รีบติดต่อศูนย์ทันตกรรมทันที
- วันที่ 2 หรือ 3 หลังการผ่าตัด สามารถรับประทานอาหารอ่อนๆ หรือ อาหารที่เคี้ยวได้ง่ายต่อไป ประมาณ 1 สัปดาห์
- ควรรับประทานยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของทันตแพทย์และควรรับประทานจนยาหมด

ไม่ควรหยุดรับประทานยา

- อาการแพ้ เช่น ผื่นคันตามผิวหนัง และ Anaphylactic shock อาจเกิดจากการแพ้ยา ถ้ามีอาการดังกล่าวให้ผู้ป่วยหยุดยา และติดต่อมายังศูนย์ทันตกรรมทันที ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ และ/หรืออาเจียนซึ่งอาจเกิดจากผลข้างเคียงของยา ให้ผู้ป่วยรับประทานยาหลังอาหารทันที และดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองลำไส้

- ควรใช้น้ำยาบ้วนปากแบบฆ่าเชื้อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเช้า และก่อนนอน อนามัย ประมาณ 60 วินาที แล้วจึงบ้วนออก และ ใช้น้ำยาฆ่าเชือนี้ติดต่อกันทุกวันจนหมด
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
- ไม่ควรใส่ฟันปลอมอันเก่า จนกว่าจะได้รับการแก้ไข เพราะอาจมีผลต่อบริเวณแผล
- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย 3 วันแรกหลังการผ่าตัด
- พยายามนอนบนหมอนสูงในช่วงวันแรกๆ หลังการผ่าตัดเนื่องจากสามารถช่วยลดอาการบวมที่จะเกิดขึ้นได้
- หากได้รับการเย็บแผล ควรกลับมาตัดไหมภายหลังการผ่าตัด 7-10 วัน ในกรณีเย็บด้วยไหมธรรมดา
- ในกรณีที่เย็บด้วยไหมละลาย สามารถรอให้ไหมละลายได้เองภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่ถ้ารู้สึกว่ามีไหมเหลืออยู่ควรกลับมาตัดออก

กรณีตัวเชื่อม (Abutment) หลุด กรุณาเก็บชิ้นส่วนไว้ และติดต่อศูนย์ทันตกรรมเพื่อทำนัดหมาย



เมื่อมีอาการฉุกเฉินสามารถติดต่อศูนย์ทันตกรรม หรือโรงพยาบาลทันที
อาการที่ควรมาพบทันตแพทย์ก่อนวันนัด มีดังนี้

- เลือดออกมาก
- อาการปวดอย่างรุนแรง
- เกิดอาการบวมอย่างชัดเจน

