



**B**angkok  
**I**nternational  
**D**ental  
**C**enter



**BIDC**<sup>TM</sup>  
Bangkok International Dental Center



ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)  
โทร. 02 692 4433 , 02 245 0055

Email: [contact@bangkokdentalcenter.com](mailto:contact@bangkokdentalcenter.com)  
[www.ThailandDentalClinic.com](http://www.ThailandDentalClinic.com)

เวลาทำการ :


วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 20.00 น.  
วันอาทิตย์ 09.00 น. - 17.00 น.  
วันนักขัตฤกษ์ 09.00 น. - 18.00 น.



คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดในการรับการรักษาทางทันตกรรม



Follow me:



QR CODE

SCAN ME



@bidcdental

ศูนย์ทันตกรรม  
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

โทร. 02 692 4433 , 02 245 0055

## คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ในการรับการรักษาทางทันตกรรม



### ก่อนนัดหมาย

1. กรณีมีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือหัวใจวายภายใน 30 วัน ให้พิจารณาทำเฉพาะกรณีฉุกเฉินในโรงพยาบาลเท่านั้น
2. หลังอาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวถึงความพร้อมของร่างกายในการรับการรักษาทางทันตกรรม
3. คำวินิจฉัยชนิดหรือกลุ่มยาที่ผู้ป่วยได้รับร่วมกับระดับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเลือดออกของหัตถการทันตกรรม ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวในกรณีที่ต้องหยุดยาหรือจำเป็นต้องปรับยา ก่อนรับการรักษาทางทันตกรรม

### ประเภทของหัตถการทางทันตกรรมแบ่งระดับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเลือดออกได้เป็น 3 กลุ่ม

**กลุ่มที่ 1** หัตถการที่แทบไม่มีเลือดออก เช่น การอุดฟันเหนือขอบเหงือก การติดเครื่องมือจัดฟัน เป็นต้น ผู้ที่รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดสามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่แทบไม่มีเลือดออกได้โดยไม่ต้องหยุดยา

**กลุ่มที่ 2** หัตถการที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะทำให้เกิดเลือดออก เช่น การรักษากล่องรากฟัน การอุดฟัน การถอนฟัน 1 ซี่ การระบายหนอง การฝังรากเทียม 1 ซี่ เป็นต้น

**กลุ่มที่ 3** หัตถการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดเลือดออก เช่น การถอนฟัน 3 ซี่ขึ้นไป การผ่าฟันคุด การเกลารากฟัน การฝังรากฟันเทียมมากกว่า 1 ซี่ขึ้นไปและ การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ เป็นต้น

**ข้อพิจารณาตามชนิดหรือกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดที่ผู้ป่วยได้รับก่อนรับบริการทันตกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเลือดออก**

1. ได้รับยา Warfarin ต้องตรวจเลือดหาค่า INR ภายใน 72 ชม. เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนทำหัตถการ
2. ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet) เช่น Aspirin, Clopidogrel, Dipyridamole, Prasugrel หรือ Ticagrelor สามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้โดยไม่ต้องหยุดยา
3. ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม NOAC เช่น Dabigatran , Apixaban หรือ rivaroxaban
  - 3.1 หัตถการที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะทำให้เกิดเลือดออก สามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้โดยไม่ต้องหยุดยา
  - 3.2 หัตถการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดเลือดออก แนะนำให้หยุดยานี้ชั่วคราวก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม และเริ่มรับยาอีกครั้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงหลังเลือดหยุดไหลในตอนค่ำ

### ข้อปฏิบัติหลังรับการรักษาทางทันตกรรม

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำหลังรับการรักษาทางทันตกรรมประเภทต่างๆอย่างเคร่งครัด
2. สังเกตการหยุดไหลของเลือดหลังการกัดผ้าก๊อชอย่างน้อย 30 นาที และหลังเริ่มรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอีกครั้ง ถ้าพบว่ามีเลือดออกผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน
3. ทานยาแก้ปวด Paracetamol เพื่อบรรเทาอาการปวดกรณีไม่มีประวัติว่าแพ้ยาหรือข้อห้ามใช้ และควรหลีกเลี่ยงกลุ่มยาลดปวด NSAIDs เช่น ibuprofen, diclofenac or naproxen