



**B**angkok  
**I**nternational  
**D**ental  
**C**enter

TM


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)  
โทร. 02 692 4433 , 02 245 0055

Email: [contact@bangkokdentalcenter.com](mailto:contact@bangkokdentalcenter.com)  
[www.ThailandDentalClinic.com](http://www.ThailandDentalClinic.com)

เวลาทำการ :

วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 20.00 น.  
วันอาทิตย์ 09.00 น. - 17.00 น.  
วันนักขัตฤกษ์ 09.00 น. - 18.00 น.

Follow me:



QR CODE



SCAN ME



@bidcdental



**BIDC**

Bangkok International Dental Center



คำแนะนำ  
และข้อปฏิบัติ

หลังการรักษารากฟัน



ศูนย์ทันตกรรม  
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

โทร. 02 692 4433 , 02 245 0055



## คำแนะนำและข้อปฏิบัติ

### สำหรับผู้ที่ได้รับการรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)



#### หลังการรักษารากฟัน

- โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะมีอาการปวด หลังทำการรักษาอยู่ประมาณ 2-3 วัน
- อาการเคี้ยวเจ็บจะยังคงอยู่ประมาณ 2-3 วัน หรือผู้ป่วยบางรายอาจนานเป็นสัปดาห์ถึงเดือน ซึ่งอาการจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#### การใช้ยาบรรเทาอาการปวด

- หากมีอาการปวดใน 1-2 วันแรก ให้รับประทานยา Ibuprofen 400 ถึง 800 มิลลิกรัม หรือ Ponstan 500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมงหรือในผู้ป่วยที่แพ้หรือไวต่อยา Ibuprofen อาจรับประทานยา Acetaminophen ( Paracetamol, Tylenol ) 1,000 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมงหรือยาอื่นตามแพทย์สั่ง

#### การบูรณะฟันถาวร(Final Restorations)

- ทันตแพทย์จะอุดฟันชั่วคราวหลังการรักษารากฟัน
- ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณะฟันถาวรต่อไปโดยเร็ว เพื่อป้องกันฟันแตก/หัก ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ กรุณาแจ้งทันตแพทย์เพื่อการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมสำหรับอุดชั่วคราว
- การทำคีย์และครอบฟัน การอุดฟัน (Onlay, Filling) สามารถปิดคลองรากฟันและช่วยป้องกันฟันแตก
- ฟันที่ทำการรักษารากฟันควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวหรือกัดของแข็งจนกระทั่งทำการบูรณะฟันเสร็จสมบูรณ์

#### คำแนะนำในการติดตามการรักษา

- ผู้ป่วยควรกลับมาตรวจประมาณ 1 ปีหลังจากทำการรักษารากฟัน
- ถึงแม้ว่าการรักษารากฟันจะประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่อาจพบว่าในผู้ป่วยประมาณ 5-15% เกิดอาการกลับเป็นซ้ำได้ใหม่โดยพบว่ามีฟันที่ปลายราก (รอยโรค) ยังไม่หาย ซึ่งอาจเกิดจากภาพถ่ายเอกซเรย์ฟันของผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วย อาจจะไม่มีหรือมีอาการก็ได้
- ในผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาซ้ำหรือได้รับการผ่าตัดปลายรากฟัน นอกจากนี้การถอนฟันอาจเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษา

“

”

ถ้ามีอาการปวดหรือบวมมาก (ซึ่งรับประทานยาแก้ปวดตามแพทย์สั่งแล้วอาการไม่ทุเลา)  
กรุณาติดต่อมายังศูนย์ทันตกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 02-6924433 , 02-2450055